I. الدوال الأسية النبيرية : Fonctions Exponentielles :

1. تعريف :

نعلم أن $\ln$ دالة متصلة وتزايدية قطعا على المجال $]0,+\infty[$. إذن $\ln$ تقابل من المجال $]0,+\infty[$ نحو المجال $J=\left]\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x\,,\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x\right[=]-\infty,+\infty[=\mathbb{R}$.

الدالة العكسية للدالة $\ln$ تسمى الدالة الأسية النبيرية ونرمز لها بالرمز $\exp$ ، ولدينا : $\exp=\ln^{-1}$ و

$$\begin{array}{rccl}\exp & : & \mathbb{R} & \to &]0,+\infty[\\ & & x & \mapsto & \exp(x)=\ln^{-1}(x)\end{array}$$

2. ملاحظات :

- ✓ $\exp$ دالة متصلة وتزايدية قطعا على المجال $]0,+\infty[$. ($\exp=\ln^{-1}$)
- ✓ نعلم أن : $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$. إذن :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\exp(x)=0} \quad \text{و} \quad \boxed{\lim_{x\to+\infty}\exp(x)=+\infty}$$

- ✓ $\boxed{\forall x\in\mathbb{R}\ :\ \exp(x)>0}$.
- ✓ مجموعة تعريف الدالة $\exp$ هي $\mathbb{R}$.

3. قاعدة التحويل :

$$\boxed{\forall x\in]0,+\infty[\ ,\ \forall y\in\mathbb{R}\ :\ \ln x=y\Leftrightarrow x=\exp(y)}$$

مثال :

$$\ln(1)=0\Rightarrow\exp(0)=1$$
$$\ln(e)=1\Rightarrow\exp(1)=e$$
$$\ln(e^2)=2\Rightarrow\exp(2)=e^2$$

4. خاصيات :

لكل $x\in\mathbb{R}$ ولكل $y\in\mathbb{R}$ ولكل $n\in\mathbb{N}$ ولكل $r\in\mathbb{Q}$ ، لدينا :

$$\exp(x+y)=\exp(x)\times\exp(y)$$
$$\exp(-x)=\frac{1}{\exp(x)} \quad \text{و} \quad \exp(x-y)=\frac{\exp(x)}{\exp(y)}$$
$$\exp(nx)=\left(\exp(x)\right)^n \quad \text{و} \quad \exp(rx)=\left(\exp(x)\right)^r$$

برهان :

نضع : $a=\exp(x)$ و $b=\exp(y)$. إذن : $x=\ln(a)$ و $y=\ln(b)$ و $a>0$ و $b>0$.

ولدينا : $\ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)=x+y$ و $ab>0$. إذن : $ab=\exp(x+y)$. أي :

$$\exp(x+y)=\exp(x)\times\exp(y)$$

5. كتابة جديدة ل $\exp(x)$:

نعلم أن : $\forall r\in\mathbb{Q}\ :\ \ln(e^r)=r$. إذن : $\forall r\in\mathbb{Q}\ :\ \exp(r)=e^r$. ثم نمدد هذه العلاقة إلى $\mathbb{R}$:

نتيجة : $\boxed{\forall x\in\mathbb{R}\ :\ \exp(x)=e^x}$

6. نتائج :

$(i$ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$; $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$

$(ii$ $\forall x \in]0,+\infty[$; $\forall y \in \mathbb{R}$: $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = e^y$

$(iii$ $\forall x \in \mathbb{R}$; $\forall y \in \mathbb{R}$; $\forall r \in \mathbb{Q}$:

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} \quad ; \quad e^{x+y} = e^x e^y$$
$$e^{rx} = \left(e^x\right)^r \quad ; \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$$

$(iv$ لدينا :

$$\exp : \mathbb{R} \to]0,+\infty[$$
$$x \mapsto \exp(x) = e^x$$

7. نهايات هامة :

$$\lim_{x\to0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0 \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

برهان :

نعتبر $t = e^x$. لدينا : $x \to +\infty$. إذن : $t \to +\infty$. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = \lim\limits_{t\to+\infty} \frac{t}{\ln(t)} = \lim\limits_{t\to+\infty} \frac{1}{\frac{\ln(t)}{t}} = +\infty$.

ولدينا : $t \to 0^+$. إذن : $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = \lim\limits_{t\to0^+} t\ln(t) = -\infty$.

ولدينا : $x \to 0$. إذن : $t \to 1$. $\lim\limits_{x\to0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim\limits_{t\to1} \frac{t-1}{\ln(t)} = \lim\limits_{t\to1} \frac{1}{\frac{\ln(t)}{t-1}} = 1$.

مثال : أحسب النهايات التالية :

$$C = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^2} \quad ; \quad B = \lim_{x\to-\infty} x^3 e^x \quad ; \quad A = \lim_{x\to-\infty} x^2 e^x$$

$$F = \lim_{x\to-\infty} xe^{2x} \quad ; \quad E = \lim_{x\to+\infty} x\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) \quad ; \quad D = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}e^{-x}$$

8. خاصيات :

خاصية 1 :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad : \quad \ln\left(e^x\right) = x$$
$$\forall x \in]0,+\infty[\quad : \quad e^{\ln(x)} = x$$

خاصية 2 :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad : \quad e^x > 0$$
$$\forall x \in \mathbb{R} \quad ; \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad :$$
$$e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$$
$$e^x < e^y \Leftrightarrow x < y$$
$$e^x \le e^y \Leftrightarrow x \le y$$

مثال : 1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : (E): $e^x-5+6e^{-x}=0$.

2. حل في $\mathbb{R}$ المراجحة : (I): $e^x-5+6e^{-x}>0$.

الجواب :

1. نضرب طرفي المتعادلة (E) في e^x فنجد :

$$(E) \Leftrightarrow (e^x)^2-5e^x+6=0$$
$$\Leftrightarrow t^2-5t+6=0 \quad / \quad t=e^x$$

ولدينا : $\Delta=1$. إذن : $t=2$ أو $t=3$. وبالتالي فإن :

$$(E) \Leftrightarrow e^x=2 \text{ أو } e^x=3$$
$$\Leftrightarrow x=\ln(2) \text{ أو } x=\ln(3)$$

وبالتالي فإن : $S=\{\ln(2) \ , \ \ln(3)\}$.

2. بنفس الطريقة ، نجد :

$$(F) \Leftrightarrow (e^x)^2-5e^x+6<0$$
$$\Leftrightarrow t^2-5t+6<0 \quad / \quad t=e^x$$
$$\Leftrightarrow 2<t<3 \quad / \quad t=e^x$$
$$\Leftrightarrow 2<e^x<3$$
$$(F) \Leftrightarrow \ln(2)<x<\ln(3)$$

وبالتالي فإن : $S=]\ln(2),\ln(3)[$.

II. مشتقة الدالة الأسية : Dérivée de la fonction Exponentielle :

1. الدالة المشتقة للدالة exp :

لدينا : $\exp=\ln^{-1}$: $\mathbb{R} \mapsto]0,+\infty[$.

- ✓ $\ln$ دالة قابلة للاشتقاق على المجال $]0,+\infty[$.
- ✓ $\forall x \in]0,+\infty[$: $ln'(x)=\frac{1}{x}\neq 0$.

إذن : $\exp=\ln^{-1}$ دالة قابلة للاشتقاق على المجال : $\ln(]0,+\infty[)=\mathbb{R}$ ، ولدينا:

$$\forall x \in \mathbb{R} \ : \ exp'(x)=\left(\ln^{-1}\right)'(x)=\frac{1}{ln'\left(\ln^{-1}(x)\right)}=\frac{1}{\frac{1}{\ln^{-1}(x)}}=\ln^{-1}(x)=\exp(x)$$

وبالتالي فإن : $\forall x \in \mathbb{R}$: $(e^x)'=e^x$.

خاصية :

exp دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، ولدينا :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R} \ : \ (e^x)'=e^x}$$

2. مشتقة مركبة exp ودالة قابلة للاشتقاق على مجال :

خاصية :

لتكن u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I . إذن :

$x \mapsto e^{u(x)}$ دالة قابلة للاشتقاق على المجال I ، ولدينا :

$$\forall x \in \mathbb{R} \ : \ \left(e^{u(x)}\right)' = u'(x) \times e^{u(x)}$$

لأن : $\left(e^{u(x)}\right)' = (\exp \circ u)'(x) = u'(x) \times exp'\left(u(x)\right) = u'(x) \times \exp\left(u(x)\right) = u'(x) \times e^{u(x)}$.

مثال :

$$\forall x \in \mathbb{R} \ : \ \left(e^{-x}\right)' = (x)' e^{-x} = -e^{-x} \ .$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \ : \ \left(e^{2x}\right)' = (2x)' e^{2x} = 2e^{2x} \ .$$

3. منحنى الدالة exp :

جدول تغيرات الدالة exp :

x	$-\infty$		$+\infty$
$exp'(x)$		$+$	
$\exp(x)$	0	↗	$+\infty$

منحنى الدالة exp :



III. الدالة الأسية للأساس a : Fonction Exponentielle à base a :

1. تعريف :

ليكن $a>0$ و $a\neq 1$. نعلم أن $\log_a$ تقابل من المجال $]0,+\infty[$ نحو $\mathbb{R}$.
التقابل العكسي للدالة $\log_a$ يسمى الدالة الأسية للأساس a ، ونرمز لها بالرمز $\exp_a$ ولدينا:

$$\exp_a=\log_a^{-1} \quad : \quad \mathbb{R} \to]0,+\infty[$$
$$x \mapsto \exp_a(x)=\log_a^{-1}(x)$$

2. قاعدة التحويل :

$$\forall x\in]0,+\infty[\ ; \ \forall y\in\mathbb{R} \ : \quad \log_a(x)=y \Leftrightarrow x=\exp_a(y)$$

مثال :

$$\log_a(1)=0 \Rightarrow \exp_a(0)=1$$
$$\log_a(a)=1 \Rightarrow \exp_a(1)=a$$
$$\log_a(a^2)=2 \Rightarrow \exp_a(2)=a^2$$

3. كتابة جديدة ل $\exp_a(x)$:

ليكن $a>0$ و $a\neq 1$. لدينا : $\forall r\in\mathbb{Q} \ : \ \log_a(a^r)=r$. إذن : $\forall r\in\mathbb{Q} \ : \ \exp_a(r)=a^r$.

يمكن أن نعمم هذه النتيجة كما يلي : $\boxed{\forall x\in\mathbb{R} \ : \ \exp_a(x)=a^x}$. إذن :

$$\exp_a \quad : \quad \mathbb{R} \to]0,+\infty[$$
$$x \mapsto \exp_a(x)=a^x$$

4. خاصيات :

ليكن $a>0$ و $a\neq 1$.

لكل $x\in\mathbb{R}$ ولكل $y\in\mathbb{R}$ ولكل $r\in\mathbb{Q}$ ، لدينا :

$$\exp_a(x+y)=\exp_a(x)\times\exp_a(y)$$
$$\exp_a(x-y)=\frac{\exp_a(x)}{\exp_a(y)} \quad ; \quad \exp_a(-x)=\frac{1}{\exp_a(x)}$$
$$\exp_a(rx)=\left(\exp_a(x)\right)^r$$

وبتعبير آخر ، لدينا :

لكل $a>0$ و لكل $x\in\mathbb{R}$ ولكل $y\in\mathbb{R}$ ولكل $r\in\mathbb{Q}$ ، لدينا :

$$a^{rx}=\left(a^x\right)^r \quad ; \quad 1^x=1 \quad ; \quad a^{x+y}=a^x\times a^y$$
$$a^{xy}=\left(a^x\right)^y \quad ; \quad a^{x-y}=\frac{a^x}{a^y} \quad ; \quad a^{-x}=\frac{1}{a^x}$$

برهان : نضع : $\alpha=\exp_a(x)$ و $\beta=\exp_a(y)$.

إذن : $x=\log_a(\alpha)$ و $y=\log_a(\beta)$ و $\alpha>0$ و $\beta>0$.

ومنه فإن : $\log_a(\alpha\beta)=\log_a(\alpha)+\log_a(\beta)=x+y$ و $\alpha\beta>0$.

إذن : $\exp_a(x+y)=\alpha\beta=\exp_a(x)\exp_a(y)$ ...

قاعدة التحويل تصير : $\boxed{\forall x\in\left]0,+\infty\right[\ ;\ \forall y\in\mathbb{R}\ :\ \log_a(x)=y\Leftrightarrow x=a^y}$

مثال : لدينا : $3^x=2\Leftrightarrow x=\log_3(2)=\dfrac{\ln 2}{\ln 3}$

لاحظ أن :

$$\begin{aligned}3^x=2 &\Leftrightarrow \ln(3^x)=\ln(2)\\ &\Leftrightarrow x\ln(3)=\ln(2)\\ &\Leftrightarrow x=\frac{\ln 2}{\ln 3}\\ 3^x=2 &\Leftrightarrow x=\log_3(2)\end{aligned}$$

5. كتابة جديدة ل $\exp_a(x)$:

أ- ليكن $a>0$ و $a\neq 1$. ليكن $x\in\mathbb{R}$. نضع : $y=\exp_a(x)$. إذن :

$$\begin{aligned}y=\exp_a(x) &\Leftrightarrow x=\log_a(y)\\ &\Leftrightarrow x=\frac{\ln y}{\ln a}\\ &\Leftrightarrow x\ln a=\ln y\\ y=\exp_a(x) &\Leftrightarrow y=e^{x\ln a}\end{aligned}$$

نتيجة 1 : لكل $a>0$ و $a\neq 1$ ، لدينا : $\boxed{\forall x\in\mathbb{R}\ :\ \exp_a(x)=a^x=e^{x\ln a}}$

مثال : لدينا : $3^{\sqrt{5}}=e^{\sqrt{5}\ln 3}$.

ب- نتيجة 2 : لكل $a>0$ ، لدينا : $\boxed{\forall x\in\mathbb{R}\ :\ a^x=e^{x\ln a}}$

لاحظ أنه تم تمديد النتيجة1 بإضافة الحالة $a=1$.

6. مشتقة الدالة $\exp_a(x)$ حيث $a>0$ و $a\neq 1$:

ليكن $x\in\mathbb{R}$ ، لدينا : $\exp_a'(x)=\left(e^{x\ln a}\right)'=(x\ln a)'e^{x\ln a}=(\ln a)e^{x\ln a}=(\ln a)\exp_a(x)$

نتيجة 1 : $\boxed{\forall x\in\mathbb{R}\ :\ \exp_a'(x)=\ln(a)\exp_a(x)}$

نتيجة 2 : $\boxed{\forall x\in\mathbb{R}\ :\ \left(a^x\right)'=\ln(a)\times a^x}$

مثال : لدينا : $\left(2^x\right)'=(\ln 2)\times 2^x>0$. $\forall x\in\mathbb{R}$:

IV. تمارين تطبيقية :

تمرين تطبيقي رقم 1 :

نعتبر f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} f(x)=(x-1)e^{\frac{1}{x-1}} & ; \quad x<1 \\ f(x)=x-1-\dfrac{\ln(x)}{x} & ; \quad x\geq 1 \end{cases}$$

1. أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب- بين أن f متصلة في 1 .

2. أ- أدرس قابلية اشتقاق f في 1 .

ب- بين أن $f'(x)=\dfrac{x-2}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$: $\forall x\in]-\infty,1[$.

جـ- تحقق من أن f تزايدية قطعا على المجال $]1,+\infty[$.

د- أعط جدول تغيرات الدالة f .

3. أ- تحقق من أن المستقيم (D): $y=x-1$ مقارب للمنحنى $(\mathscr{C}_f)$ بجوار $+\infty$ ، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى $(\mathscr{C}_f)$ والمستقيم (D) .

ب- بين أن : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)-x=0$.

4. أنشئ المنحنى $(\mathscr{C}_f)$.

الحل :

1. أ- لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^{\frac{1}{x-1}}=\boxed{-\infty}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x-1-\dfrac{\ln x}{x}=\boxed{+\infty}$.

ب- دراسة اتصال الدالة f في 1 :

لدينا : $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to1^+} x-1-\dfrac{\ln x}{x}=0=f(1)$

و لدينا : $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}(x-1)e^{\frac{1}{x-1}}=\lim\limits_{t\to-\infty}\dfrac{1}{t}\times e^t=0=f(1)$ ، وذلك بوضع $t=\dfrac{1}{x-1}$.

إذن : $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=f(1)$. ومنه فإن f متصلة في 1 .

2. أ- دراسة قابلية اشتقاق الدالة f في 1 :

لدينا : $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x-1-\frac{\ln x}{x}}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}1-\dfrac{\ln x}{x-1}\times\dfrac{1}{x}=1-1=\boxed{0}$. إذن :

f قابلة للاشتقاق على اليمين في 1 و $\boxed{f'_d(1)=0}$. ومنه فإن المنحنى $(\mathscr{C}_f)$ يقبل نصف مماس أفقي (T_d) على اليمين في النقطة ذات الأفصول 1 معادلته :

(T_d) : $\boxed{\begin{cases} y=0 \\ x\geq 1 \end{cases}}$: أي . $\begin{cases} y=f'_d(1)(x-1)+f(1) \\ x\geq 1 \end{cases}$

ولدينا: $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{(x-1)e^{\frac{1}{x-1}}}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-} e^{\frac{1}{x-1}}=\lim\limits_{t\to-\infty} e^t=\boxed{0}$ حيث $t=\dfrac{1}{x-1}$

إذن: f قابلة للاشتقاق على اليسار في 1 و $\boxed{f'_g(1)=0}$. ومنه فإن المنحنى $(\mathscr{C}_f)$ يقبل نصف

مماس أفقي (T_g) على اليسار في النقطة ذات الأفصول 1 معادلته :

$$(T_g): \begin{cases} y = f'_g(1)(x-1)+f(1) \\ x \le 1 \end{cases} \text{ أي : } \boxed{\begin{cases} y=0 \\ x \le 1 \end{cases}} : (T_g)$$

وبما أن $f'_g(1)=f'_d(1)=0$ ، فإن f قابلة للاشتقاق في 1 و $\boxed{f'(1)=0}$.

ومنه نستنتج أن للمنحنى $(\mathscr{C}_f)$ مماس أفقي (T) في النقطة ذات الأفصول 1 معادلته :

$$(T): y = f'(1)(x-1)+f(1) \text{ أي : } \boxed{y=0} : (T)$$

ب- ليكن $x \in]-\infty,1[$ ، لدينا :

$$f'(x)=\left((x-1)e^{\frac{1}{x-1}}\right)'=(x-1)'e^{\frac{1}{x-1}}+(x-1)\left(e^{\frac{1}{x-1}}\right)'=e^{\frac{1}{x-1}}+(x-1)\left(\frac{1}{x-1}\right)'e^{\frac{1}{x-1}}$$

$$=e^{\frac{1}{x-1}}\left[1+(x-1)\left(-\frac{(x-1)'}{(x-1)^2}\right)\right]$$

$$=e^{\frac{1}{x-1}}\left[1-\frac{1}{x-1}\right]$$

$$\boxed{f'(x)=\left(\frac{x-2}{x-1}\right)e^{\frac{1}{x-1}}}$$

جـ- ليكن $x \in]1,+\infty[$ ، لدينا :

$$f'(x)=\left(x-1-\frac{\ln x}{x}\right)'=1-0-\frac{(\ln x)'x-(\ln x)x'}{x^2}$$

$$=1-\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x}{x^2}=1-\frac{1-\ln x}{x^2}=\frac{x^2-1+\ln x}{x^2}$$

$$f'(x)=\boxed{\frac{(x-1)(x+1)+\ln x}{x^2}}$$

لدينا $x>1$. إذن : $\ln x>0$ و $x+1>0$ و $x-1>0$ و $x^2>0$. إذن : $f'(x)>0$.

وبالتلي فإن : f تزايدية قطعا على المجال $]1,+\infty[$.

د- ليكن $x \in]-\infty,1[$. لدينا : $f'(x)=\left(\frac{x-2}{x-1}\right)e^{\frac{1}{x-1}}$ ،

و بما أن $x<1 \Rightarrow \begin{cases} x-1>0 \\ x-2<-1<0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x-2}{x-1}>0$ و $e^{\frac{1}{x-1}}>0$ ،

فإن : $f'(x)>0$: $\forall x \in]-\infty,1[$. ومنه نستنتج أن f تزايدية قطعا على المجال $]-\infty,1[$.

جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	↗	

3. أ- لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-(x-1)=\lim\limits_{x\to+\infty} -\dfrac{\ln x}{x}=0$. إذن $(\mathscr{C}_f)$ يقبل مقاربا مائلا (D) بجوار $+\infty$ معادلته $\boxed{y=x-1}$.

دراسة الوضع النسبي للمنحنى $(\mathscr{C}_f)$ والمستقيم (D) :

ليكن $x\in]1,+\infty[$. لدينا : $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln x}{x}<0$. إذن $(\mathscr{C}_f)$ يوجد تحت (D) على المجال $]1,+\infty[$.

ب- لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-x=\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)e^{\frac{1}{x-1}}-x=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{e^t}{t}-\left(\dfrac{1}{t}+1\right)$

$$=\lim_{t\to0}\frac{e^t-1}{t}-1=1-1=\boxed{0}$$

وذلك بوضع $t=\dfrac{1}{x-1}$ حيث $t\underset{x\to+\infty}{\to}0$.

ومنه نستنتج أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $\boxed{y=x}$ مقارب مائل للمنحنى $(\mathscr{C}_f)$ بجوار $-\infty$.

4. إنشاء المنحنى $(\mathscr{C}_f)$:



تمرين تطبيقي رقم 2 :

نعتبر f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} f(x)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x} \quad ; \quad x\neq 0 \\ f(0)=1 \end{cases}$$

الجزء الأول : لتكن g الدالة العددية العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي :

$$g(x)=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}$$

1. حدد $\mathscr{D}_g$ حيز تعريف الدالة g .
2. أحسب نهايات g عند محدات $\mathscr{D}_g$.
3. حدد $g'(x)$ لكل x من $\mathscr{D}_g$ ، ثم أعط جدول تغيرات الدالة g .
4. استنتج أن : $g(x)>0$: $\forall x\in\mathscr{D}_g$.

الجزء الثاني :

1. حدد $\mathscr{D}_f$ حيز تعريف الدالة f .
2. أحسب نهايات f عند محدات $\mathscr{D}_f$ ، وأول النتائج المحصلة هندسيا .
3. أدرس اتصال الدالة f على اليمين في 0.
4. أدرس قابلية اشتقاق الدالة f على اليمين في 0 ، وأول النتائج المحصلة هندسيا 0.
5. حدد $f'(x)$ لكل x من $\mathscr{D}_f-\{0\}$ ، ثم أعط جدول تغيرات الدالة f .
6. أنشئ المنحنى $(\mathscr{C}_f)$.

الحل :

الجزء الأول :

1. حيز تعريف الدالة g : $\mathscr{D}_g=\left\{x\in\mathbb{R} \ / \ 1+\dfrac{1}{x}>0 \ \text{و} \ x\neq 0\right\}$

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{x+1}{x}$		$+$		$-$	‖	$+$	

وبالتالي فإن : $\mathscr{D}_g=]-\infty,-1[\cup]0,+\infty[$.

2. نهايات الدالة g عند محدات $\mathscr{D}_g$:

لدينا : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{x+1}=\ln 1-0=\boxed{0}$.

و لدينا : $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{x+1}=+\infty-1=\boxed{+\infty}$. لأن : $\lim\limits_{x\to 0^+}1+\dfrac{1}{x}=+\infty$.

نضع $t=1+\frac{1}{x}=\frac{x+1}{x}$. إذن : $t\to 0^+$ و $x=\frac{1}{t-1}$. ومنه فإن : $x+1=\frac{1}{t-1}+1=\frac{t}{t-1}$ و :

$$\lim_{x\to(-1)^-} g(x)=\lim_{x\to(-1)^-}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}=\lim_{t\to 0^+}\ln t-\frac{t-1}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{t\ln t-t+1}{t}=\boxed{+\infty}$$

3. ليكن x من $\mathscr{D}_g$ ، لدينا :

$$g'(x)=\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right)'=\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)'}{1+\frac{1}{x}}-\left(-\frac{(x+1)'}{(x+1)^2}\right)=\frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}}+\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$=-\frac{1}{x(x+1)}+\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{-(x+1)+x}{x(x+1)^2}$$

$$g'(x)=\boxed{\frac{-1}{x(x+1)^2}}$$

إشارة $g'(x)$ على $\mathscr{D}_g$ هي إشارة $(-x)$ ، ومنه نستنتج جدول تغيرات الدالة g كما يلي :

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	‖	‖		$-$	
$g(x)$	0	↗	$+\infty$ ‖	‖	$+\infty$	↘	0

4. لدينا : g متصلة وتزايدية قطعا على المجال $]-\infty,-1[$. إذن :

$$g(]-\infty,-1[)=\left]\lim_{x\to-\infty} g(x),\lim_{x\to(-1)^-} g(x)\right[=]0,+\infty[$$

ولدينا : g متصلة وتناقصية قطعا على المجال $]0,+\infty[$. إذن :

$$g(]0,+\infty 1[)=\left]\lim_{x\to+\infty} g(x),\lim_{x\to 0^+} g(x)\right[=]0,+\infty[$$

وبالتالي فإن : $g(x)>0$: $\forall x\in]-\infty,-1[\cup]0,+\infty[$.

الجزء الثاني :

1. حيز تعريف الدالة f : $\mathscr{D}_f=\left\{x\in\mathbb{R}\ /\ 1+\frac{1}{x}>0\ \text{و}\ x\neq 0\right\}\cup\{0\}$

$$=]-\infty,-1[\cup]0,+\infty[\cup\{0\}$$

$$\mathscr{D}_f=]-\infty,-1[\cup[0,+\infty[$$

2.حساب نهايات f عند محدات $\mathcal{D}_f$:

لدينا : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim\limits_{x\to\pm\infty} e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{t\to 0} e^{\frac{\ln(1+t)}{t}}=\boxed{e}$ وذلك بوضع $t=\frac{1}{x}$ ، حيث $t\underset{x\to\pm\infty}{\to}0$. إذن $(\mathscr{C}_f)$ يقبل مقاربا أفقيا بجوار $\pm\infty$ معادلته $\boxed{y=e}$.

وبوضع $t=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ ، نجد $t\underset{x\to(-1)^-}{\to}+\infty$ لأن : $\lim\limits_{x\to(-1)^-}1+\frac{1}{x}=0^+$ و $\lim\limits_{t\to 0^+}\ln t=-\infty$.

إذن : $\lim\limits_{x\to(-1)^-} g(x)=\lim\limits_{x\to(-1)^-}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim\limits_{x\to(-1)^-} e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{t\to+\infty} e^t=\boxed{+\infty}$.

ومنه فإن $(\mathscr{C}_f)$ يقبل مقاربا عموديا معادلته $\boxed{x=-1}$.

3. دراسة اتصال الدالة f على اليمين في 0 .

نضع : $t=\frac{1}{x}$. إذن : $t\underset{x\to 0^+}{\to}+\infty$ ، ومنه فإن :

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{x\to 0^+} e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$=\lim_{t\to+\infty} e^{\frac{\ln(1+t)}{t}}=\lim_{t\to+\infty} e^{\frac{\ln\left(t\left(1+\frac{1}{t}\right)\right)}{t}}$$

$$=\lim_{t\to+\infty} e^{\frac{\ln t+\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)}{t}}=\lim_{t\to+\infty} e^{\frac{\ln t}{t}+\frac{1}{t}\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)}=e^0=\boxed{1}$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=1=f(0)$$

وبالتالي فإن الدالة f متصلة على اليمين في 0.

4. دارسة قابلية اشتقاق الدالة f على اليمين في 0 :

لدينا : $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}-1}{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\times\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$

نضع : $t=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$. نعلم أن : $t\underset{x\to 0^+}{\to}0$:

(بوضع $u=\frac{1}{x}$ ، $\lim\limits_{x\to 0^+} t=\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{\ln(1+u)}{u}=\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{\ln u}{u}+\frac{1}{u}\ln\left(\frac{1}{u}+1\right)=0$

إذن : $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}-1}{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{t\to 0}\frac{e^t-1}{t}=1$ ، ولدينا : $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=+\infty$.

ومنه نستنتج أن : $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=1\times+\infty=\boxed{+\infty}$.

وبالتالي فإن f غي رقابلة للاشتقاق على اليمين في 0 .

تأويل هندسي : $(\mathscr{C}_f)$ يقبل نصف مماس رأسي على يمين النقطة ذات الأفصول 0 موجه نحو الأعلى .

5. ليكن x عنصرا من $\mathscr{D}_f - \{0\}$ ، لدينا :

$$f'(x)=\left(e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right)'$$

$$=\left(x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)'e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$=\left[x'\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+x\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)'\right]e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$=\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+x\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)'}{1+\frac{1}{x}}\right]e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$=\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+x\frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}}\right]e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$f'(x)=\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right]e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$\boxed{f'(x)=g(x)e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}}$$

وحسب السؤال 4 من الجزء الأول ، لدينا : $f'(x)>0$: $\forall x\in]-\infty,-1[\cup]0,+\infty[$.

جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		‖		$+\infty$	$+$	
$f(x)$	e	↗	‖		$-\infty$	↗	1

6. إنشاء المنحنى $(\mathscr{C}_f)$:



بالتوفيق إنشاء الله