


الإسقاط

القدرات المنتطرة

*- الترجمة المتجهية لمبرهنة طاليس.

1- مسقط نقطة على مستقيم

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و M نقطة من المستقيم (Δ) يوجد مستقيم وحيد مار من M و يوازي (Δ) . هذا المستقيم يقطع (D) في نقطة وحيدة M' النقطة M' تسمى مسقط M على (D) بتواز مع (Δ)



تعريف

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و M نقطة من المستوى مسقط النقطة M على (D) بتواز مع (Δ) هو نقطة تقاطع (D) مع المستقيم الموازي للمستقيم (Δ) و المار من M

ملاحظة: إذا كانت $M \in (D)$ فان مسقط M على (D) بتواز مع (Δ) هو نفسها.

2- الإسقاط على مستقيم بتواز مع آخر


أ- تعريف

(D) و (D') مستقيمان متقاطعان الطريقة التي تربط كل نقطة M من المستوى بمسقطها M' على المستقيم (D) بتواز مع المستقيم (Δ) تسمى الإسقاط على (D) بتواز مع (Δ) .

ب- الإسقاط العمودي على مستقيم

تعريف 1

الإسقاط على مستقيم (D) بتواز مع مستقيم عمودي عليه يسمى الإسقاط العمودي على (D)




تعريف 2

مسقط النقطة M على المستقيم (D) بتواز مع مستقيم عمودي عليه يسمى المسقط العمودي للنقطة M على (D)

3- خاصيات أولية

أ- خاصية 1




- كل نقطة من (D) منطبقة مع مسقطها على (D) بتواز مع (Δ) .
- كل نقطة منطبقة مع مسقطها على (D) بتواز مع (Δ) تنتمي إلى (D)

مفردات

- إذا كان مسقط النقطة M هي نفسها على (D) بتواز مع (Δ) نقول إن M **صامدة** بالإسقاط على (D) بتواز مع (Δ) .
 - المستقيم (D) **صامدة** بالإسقاط على (D) بتواز مع (Δ) .
- نمبر عن الخاصية 1 بالتعبير التالي:


مجموعة النقط الصامدة بالإسقاط على (D) بتواز مع (Δ) هي المستقيم (D)

ب- خاصية 2




لتكن A نقط من مستقيم (D) .
مجموعة النقط التي لها نفس المسقط A على (D) بتواز مع (Δ) هي المستقيم المار من A و الموازي للمستقيم (Δ)

ج- خاصية 3




إذا كان مستقيم (Δ') يوازي (Δ) فإن الإسقاط على (D) بتواز مع (Δ) هو الإسقاط على (D) بتواز مع (Δ')
نقول إن الإسقاط على (D) بتواز مع (Δ) لا يتغير بتعويض (Δ) بمستقيم له نفس الاتجاه.

4- مسقط شكل



أ- تعريف

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و (F) شكلا من المستوى و (F') جزء من المستقيم (D) نقول إن (F') مسقط الشكل (F) إذا وفقط إذا تحقق:
- مسقط كل نقطة من (F) على (D) بتواز مع (Δ) ينتمي إلى (F') .
- كل نقطة من (F') هي مسقط نقطة على الأقل من (F) على (D) بتواز مع (Δ) .



خاصية (مقبولة)

لتكن A و B نقطتين مختلفتين و A' و B' مسقطيهما على مستقيم (D) بتواز مع مستقيم (Δ) بالتوالي. مسقط $[AB]$ هو $[A'B']$

ملاحظة:

إذا كان $(AB) \parallel (\Delta)$ فإن $A' = B'$ ومنه مسقط $[AB]$ هي القطعة المنعدمة $[A'A']$.

**ج- مسقط منتصف قطعة
خاصية**

إذا كان A' و B' مسقطي النقطتين A و B على مستقيم (D) بتواز مع مستقيم (Δ) بالتوالي فإن: مسقط منتصف القطعة $[AB]$ هو منتصف $[A'B']$.
نعبّر عن هذا بقولنا: الإسقاط على (D) بتواز مع (Δ) يحافظ على المنتصف.

**5- مبرهن طاليس المباشرة و العكسية متجهيا - الإسقاط ومعامل الاستقامية لمتجهتين
أ- نشاط**

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين

$A ; B ; C ; D$ نقط من المستوى حيث $A \neq B$.

$A' ; B' ; C' ; D'$ مساقطها على (D) بتواز مع (Δ) .

1- لنفترض أن $A ; B ; C$ نقط مستقيمة حيث $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB}$

بين أن $\overrightarrow{A'C'} = \lambda \overrightarrow{A'B'}$

2- لنفترض أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

بين أن $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{C'D'}$

3- لنفترض أن $\overrightarrow{CD} = \alpha \overrightarrow{AB}$


بين أن $\overrightarrow{C'D'} = \alpha \overrightarrow{A'B'}$

تذكير لمبرهنة طاليس المباشرة و العكسية

المبرهنة المباشرة

ليكن (D) و (D') مستقيمين و $A ; B ; C$ نقط من (D) حيث $A \neq B$ و $A' ; B' ; C'$ نقط من (D')

إذا كان $(AA') \parallel (BB') \parallel (CC')$ فإن $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}$




المبرهنة العكسية

ليكن (D) و (D') مستقيمين و $A ; B ; C$ نقط من (D) حيث $A \neq B$ و $A' ; B' ; C'$ نقط من (D')

إذا كان $(AA') \parallel (BB')$ و $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'C'}}{\overline{A'B'}}$ فان (CC') يوازي (AA') و (BB')

تصحیح النشاط

1- نبين أن $\overline{A'C'} = \lambda \overline{A'B'}$




حسب طاليس فان $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'C'}}{\overline{A'B'}}$

وحيث أن $\overline{AC} = \lambda \overline{AB}$ فان $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'C'}}{\overline{A'B'}} = \lambda$

ومنه $\overline{A'C'} = \lambda \overline{A'B'}$

و نعلم أن $C' \in (A'B')$ إذن $\overline{A'C'} = \lambda \overline{A'B'}$

2- نبين أن $\overline{A'B'} = \overline{C'D'}$



$\overline{AB} = \overline{CD}$ تكافئ متوازي الأضلاع $ABDC$

ليكن I مركز $ABDC$ و I' مسقطها على (D') بتواز (D)

لدينا $\overline{IA} = -\overline{ID}$; $\overline{IB} = -\overline{IC}$

ومنه حسب (1) $\overline{I'A'} = -\overline{I'D'}$; $\overline{I'B'} = -\overline{I'C'}$

إذن $\overline{A'B'} = \overline{C'D'}$

3- نبين أن $\overline{C'D'} = \alpha \overline{A'B'}$

لدينا $\overline{CD} = \alpha \overline{AB}$ نعتبر E حيث $\overline{AB} = \overline{CE}$

ومنه $\overline{CD} = \alpha \overline{CE}$

وبالتالي حسب (1) و (2) نستنتج $\overline{A'B'} = \overline{C'E'}$

و $\overline{C'D'} = \alpha \overline{C'E'}$

إذن $\overline{C'D'} = \alpha \overline{A'B'}$

ب- مبرهنة طاليس المباشرة متجهيا

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و $A ; B ; C$ نقط مستقيمية حيث $A \neq B$ إذا كان $A' ; B' ; C'$ مساقط $A ; B ; C$ بالتوالي على (D) بتواز مع (Δ) و كان

$\overline{AC} = \lambda \overline{AB}$ فان $\overline{A'C'} = \lambda \overline{A'B'}$

ج- الإسقاط و تساوي متجهتين مبرهنة

$A ; B ; C ; D$ نقط من المستوى و $A' ; B' ; C' ; D'$ مساقطها بالتوالي

إذا كان $\overline{CD} = \overline{AB}$ فان $\overline{C'D'} = \overline{A'B'}$

د- الإسقاط ومعامل الاستقامة لمتجهتين مبرهنة


$A ; B ; C ; D$ نقط من المستوى و $A' ; B' ; C' ; D'$ مساقطها بالتوالي على مستقيم (D) بتواز مع مستقيم (Δ) إذا كان $\overline{CD} = \alpha \overline{AB}$ فإن $\overline{C'D'} = \alpha \overline{A'B'}$ نعبر عن هذا بقولنا الإسقاط يحافظ على معامل استقامة متجهتين

ذ- نتائج الإسقاط و المسافة نتيجة

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و $A ; B ; C$ نقط مستقيمة حيث $A \neq B$ و (AB) لا يوازي (Δ) إذا كان $A' ; B' ; C'$ مساقط $A ; B ; C$ بالتوالي على (D) بتواز مع (Δ) فإن $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}$

ملاحظة يمكن أن يكون $AB \neq A'B'$ نعبر عن هذا بقولنا الإسقاط لا يحافظ على المسافة
**الإسقاط و المحور
نشاط**

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و $L(O;I)$ محور حيث (L) و (Δ) غير متوازيين و O' و I' مسقطي O و I بالتوالي على (D) بتواز مع (Δ) x أفصول نقطة M في المحور $L(O;I)$ و M' مسقطها على (D) بتواز مع (Δ) حدد M' في المحور $\Delta(O';I')$



نتيجة

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و $L(O;I)$ محور حيث (L) و (Δ) غير متوازيين و O' و I' مسقطي O و I بالتوالي على (D) بتواز مع (Δ) .
 M نقطة من (L) و M' مسقطها على (D) بتواز مع (Δ) .
 إذا كان x أفصول M في المحور $L(O;I)$ فإن x هو أفصول النقطة M' في المحور $\Delta(O';I')$

ر- مبرهنة طاليس العكسية منجها نشاط

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و $A ; B ; C$ نقط من مستقيم (L) حيث $\overline{AC} = \lambda \overline{AB}$ و $A' ; B'$ مسقطي A و B بالتوالي على (D) بتواز مع (Δ) و $\overline{A'C'} = \lambda \overline{A'B'}$ لتكن C_1 مسقط C على (D) بتواز مع (Δ) .
 بين أن $C_1 = C'$


المبرهنة العكسية

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و A ; B ; C نقط مستقيمة حيث $A \neq B$
 إذا كان A' ; B' مسقطي A و B بالتوالي على (D) بتواز مع (Δ) و كان $\overline{AC} = \lambda \overline{AB}$ و
 $\overline{A'C'} = \lambda \overline{A'B'}$ فإن C' مسقط C على (D') بتواز مع (Δ)

6- الإسقاط و مجموع متجهتين نشاط

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين


نقط من المستوى F ; E ; D ; C ; B ; A حيث $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{EF}$
 A' ; B' ; C' ; D' ; E' ; F' مساقطها على (D) بتواز مع (Δ)
 لنكن S نقطة حيث $\overline{CD} = \overline{BS}$ و S' مسقطها على (D) بتواز مع (Δ)
 1- بين أن $\overline{E'F'} = \overline{A'S'}$ و $\overline{C'D'} = \overline{B'S'}$
 2- استنتج أن $\overline{A'B'} + \overline{C'D'} = \overline{E'F'}$



مبرهنة

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين و A ; B ; C ; D ; E ; F نقط من
 المستوى و A' ; B' ; C' ; D' ; E' ; F' مساقطها على (D) بتواز مع (Δ)
 إذا كان $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{EF}$ فإن $\overline{A'B'} + \overline{C'D'} = \overline{E'F'}$

7- أفصول المسقط العمودي لنقطة على محور



خاصية

إذا كان H المسقط العمودي لنقطة M على المحور $D(O;I)$ حيث $(OI=1)$ و α قياس الزاوية
 (\widehat{IOM}) فإن أفصول H هو:

-* $OM \cos \alpha$ إذا كان $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$
 -* $-OM \cos(180^\circ - \alpha)$ إذا كان $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$