

تصحیح الإمتحان الوطني لمادة الرياضيات

السنة الثانية علوم تجريبية

يوليوز 2011

ذ. سعيد الصديق ثا. الشابي التأهيلية تارودانت

التمرين الأول

① أ- لنحل في  $\mathbb{R}$  المعادلة :  $x^2 - 2x - 3 = 0$

$$\Delta' = 1 + 3 = 4$$

لدينا

$$x_1 = 1 + 2 = 3 \quad \text{و} \quad x_2 = 1 - 2 = -1 \quad \text{إذن :}$$

وبالتالي

$$S = \{-1; 3\}$$

ب- لنحل في  $\mathbb{R}$  المعادلة :  $(E): e^x - \frac{3}{e^x} - 2 = 0$

نضرب طرفي  
المعادلة في  $e^x$

$$e^x - \frac{3}{e^x} - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$$

نضع  $X = e^x$

$$(E) \Leftrightarrow X^2 - 2X - 3 = 0$$

إذن :

$$X = -1 \quad \text{أو} \quad X = 3$$

إذن :

$$X = 3 \quad \text{فإن} \quad X > 0$$

بما أن

$$e^x = 3 \text{ أي}$$

$$x = \ln 3 \quad \text{إذن}$$

$$S = \{\ln 3\}$$

وبالتالي

$$e^{x+1} - e^{-x} \geq 0 \quad \text{② لنحل في } \mathbb{R} \text{ المتراجحة}$$

$$e^{x+1} - e^{-x} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow e^{x+1} \geq e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow \ln(e^{x+1}) \geq \ln(e^{-x})$$

$$\Leftrightarrow x + 1 \geq -x$$

$$\Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}$$

$$S = \left[ -\frac{1}{2}; +\infty \right[$$

وبالتالي

التمرين الثاني

$$z^2 - 6z + 18 = 0 \quad \text{① لنحل في } \mathbb{C} \text{ المعادلة}$$

$$\Delta' = 9 - 18 = -9 = (3i)^2 \quad \text{لدينا :}$$

$$z_1 = 3 + 3i \quad \text{و} \quad z_2 = 3 - 3i \quad \text{إذن}$$

$$S = \{3 - 3i; 3 + 3i\} \quad \text{إذن}$$

② أ- لنكتب العددين  $a$  و  $b$  على الشكل المثلي :

$$a = 3 + 3i = \sqrt{18} \left( \frac{3}{\sqrt{18}} + \frac{3i}{\sqrt{18}} \right)$$

$$= 3\sqrt{2} \left( \frac{3}{3\sqrt{2}} + \frac{3i}{3\sqrt{2}} \right)$$

$$= 3\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= 3\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \left[3\sqrt{2}; \frac{\pi}{4}\right]$$

$$b = 3 - 3i = \bar{a} = \left[3\sqrt{2}; -\frac{\pi}{4}\right] \quad \text{لدينا}$$

ب- لنبين أن  $b'=6$

لتكن  $t$  الإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{OA}$

لدينا :  $\overrightarrow{OA}(3 + 3i)$  إذن الكتابة العقدية للإزاحة  $t$  هي :  $z'=z+3+3i$

بما أن  $B'$  هي صورة  $B$  بالإزاحة  $t$  فإن :

$$b' = b+3+3i = 3-3i+3+3i = 6$$

$$\frac{b-b'}{a-b'} = i \quad \text{ج- لنبين أن}$$

$$\frac{b-b'}{a-b'} = \frac{3-3i-6}{3+3i-6} = \frac{-3-3i}{-3+3i} = \frac{3i^2-3i}{3i-3} = \frac{(3i-3)i}{3i-3} = i \quad \text{لدينا}$$

طبيعة المثلث  $ABB'$  :

$$\frac{B'B}{B'A} = \frac{|b-b'|}{|a-b'|} = \left|\frac{b-b'}{a-b'}\right| = |i| = 1 \quad \text{لدينا}$$

$$B'B=B'A \quad \text{إذن :}$$


$$\left(\overrightarrow{B'A}; \overrightarrow{B'B}\right) \equiv \arg\left(\frac{b-b'}{a-b'}\right) [2\pi] \quad \text{من جهة أخرى لدينا :}$$

$$\equiv \arg(i) [2\pi]$$

$$\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

و بالتالي فإن المثلث  $AB'B$  مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في  $B'$

د-  $OAB'B$  مربع



لدينا  $\overrightarrow{OA}(3 + 3i)$  و  $\overrightarrow{BB'}(3 + 3i)$

إذن  $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BB'}$

إذن  $OAB'B$  متوازي الأضلاع

بما أن  $AB'B$  متساوي الساقين وقائم الزاوية في  $B'$

فإن  $OAB'B$  مربع

التمرين الثالث

1 أ- لدينا

$$u_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{6u_n}{1 + 15u_n} - \frac{1}{3} = \frac{3u_n - 1}{3(1 + 15u_n)}$$

$$= \frac{u_n - \frac{1}{3}}{1 + 15u_n}$$

ب-  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n > \frac{1}{3}$

من أجل  $n=0$  لدينا  $u_0 = 1 > \frac{1}{3}$

نفترض أن :  $u_n > \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_n - \frac{1}{3} > 0 \\ 15u_n + 1 > 6 > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{u_n - \frac{1}{3}}{1 + 15u_n} > 0$$

$$\Rightarrow u_{n+1} > 0$$

و بالتالي :  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n > \frac{1}{3}$

②  $(V_n)$  متتالية هندسية

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= 1 - \frac{1}{3u_{n+1}} = 1 - \frac{1}{\frac{18u_n}{1+15u_n}} = 1 - \frac{1+15u_n}{18u_n} = \frac{3u_n-1}{18u_n} \\ &= \frac{3u_n}{18u_n} - \frac{1}{18u_n} = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \times \frac{1}{3u_n} = \frac{1}{6} \left( 1 - \frac{1}{3u_n} \right) = \frac{1}{6} V_n \end{aligned}$$

وبالتالي فإن  $(V_n)$  متتالية هندسية أساسها  $\frac{1}{6}$

$$V_0 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \quad \text{لدينا}$$

$$V_n = V_0 \left( \frac{1}{6} \right)^n = \frac{2}{3} \left( \frac{1}{6} \right)^n \quad \text{إذن}$$

③ لنبين أن  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = \frac{1}{3-2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$

$$V_n = 1 - \frac{1}{3u_n} \quad \text{لدينا}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3u_n} = 1 - V_n$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{1}{3(1-V_n)}$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{1}{3\left(1-2\left(\frac{1}{6}\right)^n\right)}$$

$$u_n = \frac{1}{3-2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$$

$$\lim_{+\infty} \left( \frac{1}{6} \right)^n = 0 \quad \text{إذن} \quad -1 < \frac{1}{6} < 1 \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{+\infty} u_n = \frac{1}{3} \quad \text{و بالتالي فإن :}$$

## التمرين الرابع

$$g'(x) = \frac{x+1}{x} \quad \text{أ} \text{ 1} - \text{I}$$

$$g(x) = x - 1 + \ln x \quad \text{لدينا}$$

$$\Rightarrow g'(x) = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

ب-  $g$  تزايدية على  $\mathbb{R}^+$

$$g'(x) = \frac{x+1}{x} > 0 \quad \text{إذن } x \in ]0; +\infty[ \quad \text{لدينا}$$

إذن  $g$  تزايدية على  $\mathbb{R}^+$

$$\forall x \in [1; +\infty[ : g(x) \geq g(1) = 0 \quad \text{فإن } [1; +\infty[ \quad \text{بما أن } g \text{ تزايدية على } [1; +\infty[ \quad \text{2}$$

$$\Rightarrow \forall x \in [1; +\infty[ : g(x) \geq 0$$

$$\forall x \in ]0; 1] : g(x) \leq g(1) = 0 \quad \text{فإن } ]0; 1] \quad \text{لدينا كذلك } g \text{ تزايدية على } ]0; 1]$$

$$\Rightarrow \forall x \in ]0; 1] : g(x) \leq 0$$

$$\lim_{0^+} f(x) = +\infty \quad \text{أ} \text{ 1} - \text{II}$$

$$\lim_{0^+} \ln x = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{0^+} \frac{x-1}{x} = \left(\frac{-1}{0^+}\right) = -\infty \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{0^+} \left(\frac{x-1}{x}\right) \ln x = +\infty \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{0^+} f(x) = +\infty \quad \text{و بالتالي فإن}$$

(C) يقبل محور الأرتاب مقاربا عموديا.

$$\lim_{+\infty} f(x) = +\infty \quad \text{ب-}$$

$$\lim_{+\infty} \ln x = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{+\infty} \frac{x-1}{x} = 1 \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{+\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) \ln x = +\infty \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{+\infty} f(x) = +\infty \quad \text{أي}$$

$$\lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \quad -$$

$$\lim_{+\infty} \frac{x-1}{x} = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{لدينا} \quad -$$

$$\lim_{+\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) \frac{\ln x}{x} = 1 \times 0 = 0 \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \quad \text{و بالتالي فإن} \quad -$$

ج- (C) يقبل فرعا شلجميا في إتجاه محور الأفاصيل.

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} \quad \text{أ} \quad \textcircled{2}$$

$$f'(x) = \left( \frac{x-1}{x} \right)' \ln x + \left( \frac{x-1}{x} \right) \times \frac{1}{x} \quad \text{لدينا}$$

$$= \frac{\ln x}{x^2} + \frac{x-1}{x^2}$$

$$= \frac{x-1+\ln x}{x^2}$$

$$= \frac{g(x)}{x^2}$$

ب- لدينا إشارة  $f'(x)$  هي إشارة  $g(x)$

$$\forall x \in [1; +\infty[ : g(x) \geq 0 \quad \text{إذن}$$

$$\Rightarrow \forall x \in [1; +\infty[ : f'(x) \geq 0$$

أي  $f$  تزايدية على  $[1; +\infty[$

$$\forall x \in ]0 ; 1] : g(x) \leq 0 \quad \text{من جهة أخرى لدينا} :$$

$$\Rightarrow \forall x \in ]0 ; 1] : f'(x) \leq 0$$


**f** تناقصية على  $]0 ; 1]$ 

أي

ج - جدول تغيرات الدالة **f** على **I**

x	0	1	$+\infty$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

③ إنشاء (C) في م.م.م.

④ أ- دالة **H** أصلية للدالة **h** على **I**الدالتان **H** و **h** معرفتان على المجال **I**.

$$H'(x) = \left[ \frac{1}{2} (\ln x)^2 \right]' = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{\ln x}{x} = h(x)$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} \quad \text{ب-}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^e h(x) dx = [H(x)]_1^e = H(e) - H(1) = \frac{1}{2} \quad \text{لدينا}$$

$$\int_1^e \ln x dx = 1 \quad \text{ج-}$$



$$v'(x)=1 \quad \text{و} \quad u(x)=\ln x \quad \text{نضع :}$$

و نستعمل مكاملة بالأجزاء :

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln x dx &= \int_1^e v'(x)u(x) dx = [v(x)u(x)]_1^e - \int_1^e v(x)u'(x) dx \\ &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx \\ &= e - (e - 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \text{ أ- } f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x} \text{ لكل } x \text{ من } 1 \text{ .}$$

ليكن  $x$  من 1

$$\ln x - \frac{\ln x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x = \left(\frac{x-1}{x}\right) \ln x = f(x) \quad \text{لدينا :}$$

ب- مساحة الحيز  $s$  المحصور بين المنحنى (C) و محور الأفصائل و المستقيمان  $x=1$  و  $x=e$  :

$$s = \int_1^e |f(x)| dx \quad \text{cm}^2 \quad \text{لدينا}$$

$$\int_1^e |f(x)| dx \quad \text{لنحسب}$$

$$\int_1^e |f(x)| dx = \int_1^e \left| \ln x - \frac{\ln x}{x} \right| dx = \int_1^e \left( \ln x - \frac{\ln x}{x} \right) dx \quad \text{لدينا :}$$

$$= \int_1^e \ln x dx - \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$= 1 - \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\ln x \geq \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{لأن } x \geq 1$$

$$s=0.5\text{cm}^2$$

و بالتالي

لاتنسونا من صالح دعائكم